

## GUIDA PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI

### TAMPONE URETRALE

(da non eseguirsi in corso di terapia antibiotica)

È necessario eseguire un'adeguata pulizia locale ed evitare di urinare nelle 2-3 ore precedenti il prelievo.

Astenersi da rapporti sessuali da almeno 24h.

Per le donne: non essere in periodo mestruale (almeno 3 giorni dall'ultimo giorno di mestruazione), non eseguire irrigazioni vaginali, non utilizzare creme/ovuli/lavande nei 3 giorni precedenti.

### TAMPONE VAGINALE-ENDOCERVICALE

(da non eseguirsi in corso di terapia antibiotica)

È necessario eseguire un'adeguata pulizia locale e non essere in periodo mestruale (almeno 3 giorni dall'ultimo giorno di mestruazione). Non eseguire irrigazioni vaginali e non utilizzare creme/ovuli/lavande nei 3 giorni precedenti. Astenersi da rapporti sessuali nei 2 giorni precedenti.

### PAP-TEST E TAMPONE PER HPV

- Periodo in assenza di mestruazione (dal 10 al 21 giorno contando dal primo giorno dell'ultima mestruazione)
- Astenersi da rapporti sessuali (anche protetti) per le 48 ore precedenti l'esame
- Non utilizzare creme, lavande e ovuli vaginali per le 48 ore precedenti l'esame

### TAMPONE FARINGEO

(da non eseguirsi in corso di terapia antibiotica)

Da eseguire a digiuno da almeno 3 ore (è sconsigliato assumere anche acqua o altre bevande).